

Blütensaum heimisch

Standort:

Eine für sonnige bis halbschattige und trockene bis wechsel-trockene Standorte konzipierte Mischung.

Charakter:

Der Blüteschwerpunkt liegt im Frühjahr und Frühsommer. Dann dominieren gelbe, blaue und weiße Blütenfarben die Mischung. Fast schleierartig schweben dabei die Blüten von Strauß-Margerite und Graslilie über der Pflanzung und vermitteln eine lockere, heitere, wiesenartige Atmosphäre.

Anwendungsgebiete:

Diese Mischung eignet sich für Verkehrsinseln und Straßenbegleitgrün ebenso wie für private Hausgärten.

Pflege:

Es erfolgt eine bodennahe Komplettmahd im Spätwinter, ausgenommen wintergrüne Arten wie Helleborus.

1-3 AKmin/qm/a

NAME BOTANISCH		NAME DEUTSCH	PFLANZENINFOS	ALTERNATIVARTEN/-SORTEN	PFLANZ-/PFLEGEHINWEISE
Gerüststauden					
<i>Helleborus foetidus</i>	20	Palmbblatt-Nieswurz	heimische Wildstaude, frühe Blüte, palmates Laub		versamend, eventuell hin und wieder dezimieren, bei Mahd aussparen
<i>Tanacetum corymbosum</i>	30	Strauß-Margerite	heimische Wildstaude, üppige, weiße Blüte auf hohen Stielen		
<i>Salvia pratensis</i>	30	Wiesen-Salbei			
Begleitstauden					
<i>Anthericum ramosum</i>	100	Ästige Graslilie	heimische Wildstaude, weiße Blütenwolken im Hochsommer über grasartigem Laub		
<i>Aster amellus</i> ´Sternkugel´	50	Berg-Aster	heimische Wildstaude, kompakter Herbstblüher in Blauviolett		
<i>Bupththalmum salicifolium</i>	50	Ochsenauge	heimische Wildstaude, lange Blütezeit	<i>Inula salicifolia</i> - Weidenblättriger Alant	
<i>Geranium sanguineum</i>	50	Blut-Storchschnabel	heimische Wildart, Charakterart der thermophilen Säume mit leuchtend pinkfarbenen Blüten	Sorten wie ´Elsbeth´, ´Inverness´ oder ´Tiny Monster´ (Dauerblüher!)	
Bodendeckstauden					
<i>Ajuga reptans</i>	100	Günsel	Bodendecker mit blauvioletten Blütenkerzen im Frühsommer		
<i>Anemone sylvestris</i>	100	Hain-Anemone	schöne, weiße Blüten und auffällige, wollige Fruchtsände, über Ausläufer leicht ausbreitend		bei zu starker Bedrängung verschwindend
<i>Prunella grandiflora</i>	50	Braunelle	reichlich versamend		
<i>Teucrium chamaedrys</i>	100	Echter Gamander	heimische, ausläufertreibende Wildart mit purpurvioletter Blüte		
Füller					
<i>Campanula persicifolia</i>	100	Pfirsichblättrige Glockenblume	heimische Wildstaude mit violetten Blütenglocken, versamend		kurzlebig - versamt sich in Lücken
<i>Campanula glomerata</i>	50	Knäul-Glockenblume	blaue Blüten, kurzlebig		
<i>Linum perenne</i>	50	Staudenlein	blauer Frühsommerblüher, versamend		kurzlebig - versamt sich in Lücken
<i>Viola odorata</i>	100	Duft-Veilchen	violett-blauer Vorfrühlingsblüher		
Zwiebel- und Knollenpflanzen					
<i>Anemone nemorosa</i>	300	Buschwindröschen	heimischer, weißer Frühblüher		Rhizome dürfen vor dem Pflanzen nicht austrocknen
<i>Allium sphaerocephalum</i>	300	Roter Kugel-Lauch	rote Blütenkugeln im Sommer		
<i>Gagea lutea</i>	500	Wald-Goldstern	zierliche Pflanze mit gelben Blütensternchen in Scheindolden		





HOCHSCHULE ANHALT University of Applied Sciences

Kontakt:
Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences
Arbeitsgruppe Pflanzenverwendung
Strenzfelder Allee 28 | 06406 Bernburg (Saale)
Jessica Fenzl | E-Mail: jessica.fenzl@hs-anhalt.de