

Blütenserenade

Standort:
Eine Mischung für absonnige bis halbschattige, trockene Standorte oder auch für sonnige Flächen auf etwas frischerem Boden.

Charakter:
Helle, zarte, blauviolette und rosafarbene Töne bestimmen das Bild dieser Kombination. Vor allem im Herbst läuft die Mischung mit Pfeifengräsern, Schirm-Astern und Herbst-Anemonen zu voller Pracht auf. Ihre filigrane Wirkung entfaltet sie jedoch nur auf größeren Flächen.

Anwendungsgebiete:
Geeignet ist diese Staudenmischung für größere Flächen im öffentlichen und gewerblichen Grün wie Parkanlagen, Verkehrsinseln und Straßenbegleitgrün.

Pflege:
Es erfolgt eine bodennahe Komplettmahd im Spätwinter.

4-6 AKmin/qm/a

NAME BOTANISCH		NAME DEUTSCH	PFLANZENINFOS	ALTERNATIVARTEN/-SORTEN	PFLANZ-/PFLEGEHINWEISE
Gerüststauden					
Anemone tomentosa ‘Serenade’	10	Herbst-Anemone	von Spätsommer bis Herbst in dunklem Altrosa blühend	‘Septemberglanz’ - rosa, ‘Honorine Jobert’ - weiß, ‘Bressingham Glow’ - rosa, leicht gefüllt	
Aster umbellatus ‘Weißer Schirm’	8	Schirm-Aster	cremefarbene Blütenschirme im Spätsommer bis Frühherbst		
Molinia arundinacea ‘Transparent’	5	Rohr-Pfeifengras	heimische Wildstaude, trichterförmig aufrechtes Gras, gelbliche Herbstfärbung	Calamagrostis brachytricha	
Begleitstauden					
Calamintha nepeta ‘Triumphator’	80	Steinquendel	heimische Wildstaude, lange Blütezeit, Insektenmagnet, glänzendes aromatisches Laub		Sorte mit glänzendem Laub - Lieferung kontrollieren!
Aruncus aethusifolius ‘Misty Lace’	40	Geißbart	kleiner Geißbart mit cremeweißen Blüten	Aruncus aethusifolius ‘Johannifest’	
Heuchera villosa var. macrorrhiza	60	Purpurglöckchen	Blattschmuckstaude, samtig behaartes Laub, halbwintergrün, kleine cremefarbene Blüten-glöckchen	Heuchera villosa ‘Brownies’	
Bodendeckstauden					
Alchemilla erythropoda	100	Günsel	heimische Wildstaude, schwachwachsend, kleine Art	Geranium x cantabrigiense ‘St. Ola’	
Carex umbrosa	120	Segge	heimische Wildstaude, feinlaubig, niedrig wachsend, immergrün	Carex digitata	
Epimedium ‘Orangekönigin’	100	Elfenblume	wüchsige Sorte mit hellorangen Blüten		
Füller					
Viola corsica	150	Korsisches Stiefmütterchen	niedriger, großblumiger Dauerblüher in Violett-blau, kurzlebig und versamend	Viola sororia	kurzlebig - versamt sich in Lücken
Zwiebel- und Knollenpflanzen					
Allium nigrum	150	Schwarzer Lauch	zuverlässiger Zierlauch mit weißen Blüten in halbkugeligen Dolden		einzelnen oder in kleinen Gruppen setzen
Anemone blanda ‘Blue Shades’	1000	Balkan-Windröschen	große, blaue Blütensterne, versamend		Rhizome dürfen vor dem Pflanzen nicht austrocknen
Anemone blanda ‘White Splendour’	1000	Balkan-Windröschen	große, weiße Blütensterne, versamend		Rhizome dürfen vor dem Pflanzen nicht austrocknen



Kontakt:
Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences
Arbeitsgruppe Pflanzenverwendung
Strenzfelder Allee 28 | 06406 Bernburg (Saale)
Jessica Fenzl | E-Mail: jessica.fenzl@hs-anhalt.de