

Blütenwinter schattig

Standort:

Eine Mischung für absonnige bis halbschattige, trockene Standorte.

Charakter:

Der Blütenwinter für den Schatten ist genau wie sein sonniges Pendant ebenfalls im späteren Winter sehr attraktiv. Hier beginnt die lange Blütezeit der Schnee-Heiden und bietet damit auch Insekten eine erste Nahrungsquelle an wärmeren Tagen. Nicht nur durch die ganzjährigen Blütefolgen sondern auch über Laubformen und -texturen wirkt diese Pflanzung im Wechsel der Jahreszeiten ansprechend. Es dominieren helle, freundliche Blütenfarben, die im Schatten gut zur Geltung kommen.

Anwendungsgebiete:

Diese Mischung ist der ideale Begleiter zu lichtkronigen Baumarten, hervorragend im lichten Gehölzschatten aber auch im Gebäudeschatten gedeihend, geeignet für mittelgroße und große Flächen.

Pflege:

Die Mahd erfolgt erst spät, ca. Mitte April, nach der Blüte der Heiden und dann etwas höher auf ca. 15 bis 20 cm über dem Boden. Die Helleborus und Polypodium müssen dabei ausgespart werden.

4-6 AKmin/qm/a

NAME BOTANISCH		NAME DEUTSCH	PFLANZENINFOS	ALTERNATIVARTEN/-SORTEN	PFLANZ-/PFLEGEHINWEISE
Gerüststauden					
<i>Acanthus hungaricus</i>	20	Ungarischer Akanthus	kerzenförmige Blütenstände im Juni, spät austreibend		
<i>Panicum virgatum</i> ´Külsenmoor´	30	Rutenhirse	früh ins Rötliche färbende Blattspitzen, standfest		
<i>Solidago caesia</i>	25	Goldbandrute	elenante, bogenförmige Wuchsform zur Blütezeit, keine Samenbildung (steriler Klon)	<i>Solidago virgaurea</i>	
Begleitstauden					
<i>Aster divaricatus</i> ´Tradescant´	25	Wald-Aster	Spätsommerblüher mit langer Blütezeit, kniehoch weiße Blütenschleier		
<i>Helleborus foetidus</i>	15	Palmlblatt-Nieswurz	heimische Wildstaude, frühe Blüte, palmates Laub		
<i>Lathyrus vernus</i>	50	Frühlings-Platterbse	heimischer, niedriger Schmetterlingsblüher mit rosafarbener Blüte im April bis Mai		
<i>Luzula nivea</i>	50	Schneeweiße Hainsimse	heimische Wildstaude mit auffällig weißer Blüte im Frühsommer, wintergrün		
Bodendeckstauden					
<i>Erica carnea</i> ´Myretoun Ruby´	150	Schnee-Heide	roter Winterblüher ab Ende Januar	andere purpurne, stärker wüchsige Sorten	in Gruppen zu 5-7 Stk. pflanzen, langsamentwickelnd
<i>Erica x darleyensis</i> ´Silberschmelze´	100	Englische Heide	weiße Blüten ab Dezember bis zum Frühjahr	andere weiße, stärker wüchsige Sorten	in Gruppen zu 5-7 Stk. pflanzen, langsamentwickelnd
<i>Polypodium interjectum</i> ´Cornubiense´	60	Gesägter Tüpfelfarn	heimischer Farn mit zum Teil mehrfach fiederschnittigen Blättern, wintergrün	<i>Polypodium vulgare</i>	
<i>Fragaria vesca</i> var. <i>vesca</i>	80	Wald-Erdbeere	heimische, rankende Staude mit leckeren aromatischen Erdbeerfrüchten		am Anfang etwas wuchernd, wird mit der Zeit aber zahmer, nicht verdrängend
<i>Primula veris</i> ssp. <i>veris</i>	50	Echte Schlüsselblume	heimischer Vorfrühlingsblüher, kalkliebend, trockenheitstolerant, versamend		
Füller					
<i>Viola odorata</i> ´Königin Charlotte´	50	Duft-Veilchen	violett-blauer Vorfrühlingsblüher, reich blühende, recht großblumige Sorte	<i>Viola rupestris</i>	
Zwiebel- und Knollenpflanzen					
<i>Galanthus elwesii</i>	500	Großes Schneeglöckchen	deutlich größer und auffallender als unser heimisches <i>Galanthus nivalis</i>	<i>Puschkinia scilloides</i> var. <i>libanotica</i>	
<i>Lilium martagon</i>	100	Türkenbund-Lilie	heimische Staude mit nickenden rosa Blüten-glöckchen		
<i>Lilium martagon</i> var. <i>album</i>	50	Türkenbund-Lilie	heimische Staude mit nickenden weißen Blüten-glöckchen		



Kontakt:
Hochschule Anhalt | Anhalt University of Applied Sciences
Arbeitsgruppe Pflanzenverwendung
Strenzfelder Allee 28 | 06406 Bernburg (Saale)
Jessica Fenzl | E-Mail: jessica.fenzl@hs-anhalt.de